

恵みには、  
かかせないもの。



# ロブラール® 500アクア

作物への汚れが少なく、使いやすい。  
環境にもやさしい殺菌剤の決定版。



製品情報はこちら



**FMC**

FMC、FMCロゴ、®を付した商標は、FMC Corporationまたはその米国およびその他の国の子会社・関連会社の登録商標です。

## ロブルール<sup>®</sup>500アクアの特長

- 1 ▶ フロアブルタイプのため粉立ちがなく、薬液調製が簡単です。
- 2 ▶ 水和剤に比べ、作物への汚れを軽減することができます。
- 3 ▶ 各種作物の重要病害に対して優れた予防効果を示します。

### 適用病害および使用方法

(2023年2月現在の登録内容)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	使用回数*		使用方法
					本剤	イプロジオン	
きゅうり	菌核病、つる枯病、灰色かび病	1,000~1,500	100~300 ℓ/10a	前日	4回	5回 (種子粉衣1回、は種後4回)	散布
なす	灰色かび病						
いちご							
トマト	4回 (種子粉衣1回、は種後3回)						
おうとう	灰星病	1,500	200~700 ℓ/10a	3回	3回		
もも	1,000~1,500						
ハスカップ	灰色かび病	1,000		1回	1回		
ふさすぐり	果実腐敗症	1,000	200~700 ℓ/10a	3日	3回	3回	
いちじく	黒かび病						

\*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

### 注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきって下さい。
- 使用に当っては容器をよく振って下さい。
- ボルドー液、石灰硫黄合剤との混用はさけて下さい。
- おうとうに使用する場合、着色期以降の散布は果実に汚れを生じるおそれがあるので留意して下さい。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにして下さい。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用して下さい。
- 誤飲などのないように注意して下さい。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに水洗して下さい。
- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管して下さい。
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収して下さい。
- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努めて下さい。
- 移送取扱いは、丁寧に行ってください。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropscience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00~12:00,13:00~17:00  
土日祝日および会社休日を除く

F-2008 23.02. NY