



ダニゲッター® フロアブル

ダニ防除は 新次元へ

- 既存の殺ダニ剤に抵抗性の発達したハダニ類にも有効です。
- 優れた残効性により、長期間ハダニ類の密度を抑制します。

® ダニゲッターはバイエルグループの登録商標

【猿：バク】

人の悪夢を食べ、吉夢をもたらすと言われている空想上の霊獣。鼻は象、目は犀、尾は牛、足は虎で、体形は熊に似ているとされる。




カンザワハダニ



チャノナガサビダニ



リンゴハダニ



ナミハダニ



製品情報はここから



■ 適用害虫および使用方法（一部抜粋）（その他、かんきつに登録があります）


2023年3月現在の登録内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数（倍）	10アール当り使用液量（ℓ）	使用時期	使用回数*	使用方法
なし	ハダニ類 ニセナシサビダニ	2,000	200～700	収穫前日まで	1回	散布
りんご	リンゴハダニ ナミハダニ リンゴサビダニ					
もも ネクタリン	モモサビダニ ハダニ類					
小粒核果類 おうとう	ハダニ類					
ぶどう	ハダニ類					
茶	カンザワハダニ チャノナガサビダニ チャトゲコナジラミ チャノホコリダニ	200～400	200～400	摘採7日前まで		
りんどう	ナミハダニ	100～300	100～300	発生初期		
チューリップ	チューリップサビダニ	500	—	植付前		15分間球根浸漬

*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。


■ 試験事例

なしのナミハダニに対する効果



試験年度：平成15年 発生状況：多
試験場所：長野県南信農業試験場 散布日時：7月31日、10ℓ/樹
品 種：二十世紀 強剪定低木樹


茶のカンザワハダニに対する効果



試験年度：平成16年 発生状況：甚
試験場所：静岡県茶業研究センター 散布日時：3月31日、400ℓ/10アール
品 種：やぶきた

■ 注意事項

- 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振って下さい。
- ボルドー液との同時散布および前後14日以内の近接散布は効果が劣るおそれがあるのでさけて下さい。
- 新梢伸長期の日本なし（二十世紀を除く）に使用する場合は、以下の事項を守って下さい。
 - 豊水、新高、長十郎には新葉に葉害を生じるおそれがあるので使用しないで下さい。
 - 有機リン剤との同時散布および10日以内の近接散布は新葉に葉害を生じるおそれがあるのでさけて下さい。
- おうとうに使用する場合は、新梢伸長期に葉害を生じることがあるので、葉の硬化を待って使用して下さい。
- ぶどうに使用する場合は、新芽、新葉に葉害を生じるおそれがあるので以下の事に注意して下さい。
 - ぶどう未成木樹への散布はさけて下さい。
 - 品種「瀬戸ジャイアンツ」への使用はさけて下さい。
- 茶の覆下栽培条件下では、新芽に葉害を生じるおそれがあるので萌芽前に使用して下さい。
- りんどうに使用する場合は、品種「さわ風1」、「さわ風3」、「風鈴」、「しなの2号」、「しなの3号」等では花蕾のかく片に葉害を生じることがあるので使用はさけて下さい。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に葉害の有無を十分確認してから使用して下さい。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

- キャベツ、はくさい、こまつな、ねぎ、ばら、シンビジウム等のラン類、みょうがに対して葉害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意して下さい。
- 開花期の水稻に本剤がかかった場合、不稔などの葉害を生じる場合があるのでかからないように注意して下さい。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 誤飲などのないよう注意して下さい。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせて下さい。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに水洗して下さい。
- 使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、 洗顔・うがいをするとともに衣服を交換して下さい。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯して下さい。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意して下さい。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきって下さい。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- 直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管して下さい。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropsience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00～12:00,13:00～17:00
土日祝日および会社休日を除く