



小麦の赤かび病対策剤

殺菌剤

バラライカ[®]
BALALAIKA^B 水和剤

私の音色で穂もキレテ!!



the melody

of the wheat begins to shine

殺菌剤

農林水産省登録 第24095号



有効成分	キャプタン…50.0%	殺菌剤分類 M4
	テブコナゾール…10.0%	殺菌剤分類 3
毒性	普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）	



- ◆ 赤かび病フザリウム菌に効果の高いテブコナゾールと、ニバーレ菌に効果の高いキャプタンの混合剤です。
- ◆ DON(カビ毒の一種)生成とニバーレ菌の同時防除が可能です。
- ◆ 開花期に本剤を使用することで、安定した防除効果を示します。

登録内容

2020年8月現在の登録内容

作物	適用病害名	希釈倍数	使用液量 (10a当り)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法
小麦	赤かび病 赤さび病 黒変病 うどんこ病 葉枯症	500倍	60~150ℓ	収穫14日前まで	2回以内	散布

●キャプタンを含む農薬の総使用回数：4回以内 ●テブコナゾールを含む農薬の総使用回数：3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内)

体系防除例

使用時期	6月中旬(開花期)	2回目	3回目	4回目
推奨体系	バラライカ®B水和剤	慣行剤	シルバキュア®フロアブル	—

病害の発生状況によっては4回目の防除が省けます。

®シルバキュアはバイエルグループの登録商標

注意事項



- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきって下さい。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等のアルカリ性薬剤およびマシン油乳剤との混用はさけて下さい。
- 周辺農作物に対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意して下さい。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにして下さい。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 誤飲、誤食などのないよう注意して下さい。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせて下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 本剤は眼に対して強い刺激性があるので、眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けて下さい。

- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意して下さい。付着した場合には、直ちに石けんでよく洗い落して下さい。
- 散布液調製時および散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに、保護クリームを使用して下さい。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換して下さい。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯して下さい。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけて下さい。
- 夏期高温時の使用をさけて下さい。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきって下さい。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管して下さい。

- ※ 使用前にラベルをよく読んで下さい。
- ※ ラベルの記載以外には使用しないで下さい。
- ※ 小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropscience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00~12:00、13:00~17:00 土・日・祝日を除く

F-2123 20.08. フジプロ