

コガネムシ プラスの防除で より「いいね」



ビーラム® プラス

粒 剤

かんしょ
専用



- ネコブセンチュウ・ネグサレセンチュウ・コガネムシ類の同時防除が可能で、かんしょの秀品率の向上が期待できます。
- 残効性に優れています。
- 臭気が少なく扱いやすい粒剤です。

ビーラム®に
コガネムシ防除がプラス!

ネコブセンチュウ
ネグサレセンチュウ



コガネムシ類



製品詳細は
こちら



適用害虫および使用方法

2021年6月現在の登録内容

| 作物名 | 適用害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 使用回数* | 使用方法 |
|------|---------------------------------|----------|------|--|--------|
| かんしょ | ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ コガネムシ類 | 20kg/10a | 植付前 | 本剤……………1回 イミダクロプリド……………3回 (植付前の土壌混和は1回、散布は2回) フルオピラム……………1回 | 全面土壌混和 |

*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびそれぞれの有効成分を含む農業の総使用回数の制限を示します。

上手な使い方

防除効果を十分に発揮するために、①均一な散布、②十分な混和がとて重要です!

ポイント!

散布


植付前に土壌全面に均一に散布して下さい。



ポイント!

混和

表層から20cm程度の深さまで、ムラがないように、丁寧に土壌と混和して下さい。(土壌中の線虫は地表面から10-20cmの層に多く分布)



処理時の土壌の水分条件は手で握って開くとやや割れ目ができる程度が目安です。



長年の連作により線虫密度が高まっている圃場や、前作の残渣の残る圃場等、線虫被害が多いと予想される圃場では他の薬剤(土壌くん蒸剤)との体系処理をお奨めします。

防除効果を十分に発揮するために、**薬剤を土壌中に均一に処理する必要があります!**



ビーラム®プラス粒剤



効果の得られない範囲

<優れた効果>

薬剤が根の周りに均一に存在



薬剤の分布する域で効果が得られる

均一な散布・十分な混和

<効果不足>

薬剤が根の周りに不均一に存在



薬剤の分布しない域では効果は得られない

処理時の薬剤の偏り・不十分な混和

処理後の混和深が浅い

※本剤の使用方法は「全面土壌混和」です。使用方法を守ってご使用下さい。

注意事項

- 蚕に対して長期間毒性があるので、絶対に養蚕にかからないようにして下さい。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにして下さい。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

- 誤食などのないよう注意して下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けて下さい。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして下さい。
- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管して下さい。

ビーラム® “いいね👍” キャンペーン 実施中

皆さまからの“いいね”の声を募集し、全国から届いた声を特設ウェブサイト上でご紹介してまいります。

ビーラム®プラス粒剤を使用した感想や体験談等のコメントをお待ちしております。

詳細はこちら▶



- 使用前にはラベルをよく読んで下さい。
- ラベルの記載以外には使用しないで下さい。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropscience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎ 0120-575-078 9:00~12:00, 13:00~17:00
 土日祝日および会社休日を除く

F-1146 21.06.NY