



雑草は
圃場ごとに
防除する時代へ。

カウンシル[®]ワン
フロアブル

1



希釈液散布

ONE



製品のより詳しい
情報はこちら▶



水田雑草
テーラーメイド防除™

あなたの圃場に、適剤適所の防除を。

®カウンシルはバイエルグループの登録商標
TM:テーラーメイド防除は商標出願中

カウンシル®ワン フロアブル

農林水産省登録：第24564号

有効成分：トリアファモン…40.3% [除草剤分類 2]

性状：淡褐色水和性粘稠懸濁液体

毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指す通称）

- 1 高葉齢のノビエやSU抵抗性雑草、クログワイ・オモダカ・コウキヤガラなどの難防除雑草に対して高い除草効果を示します。**
- 2 発生する雑草の草種・発生量・発生時期に合わせて、最適な除草剤を組み合わせて使用でき、効率的な防除が可能です。**

希釈液散布

イノーバ®ワン フロアブル マイティーワン® フロアブル

こちらの2剤と組み合わせて
使うことができます。

■適用雑草と使用方法

2023年5月現在の登録内容

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量(mℓ/10a)		使用方法	使用回数*
			薬量	希釈水量		
移植水稻	ノビエ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ コウキヤガラ キシュウスズメノヒエ	移植直後～ ノビエ3葉期 ただし、 移植後30日まで	10	200～500	湛水散布 または 無人航空機による 滴下	本剤：2回 トリアファモン：2回

*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきって下さい。
- 本剤は貯蔵中に分離があるので、使用に際しては容器をよく振って下さい。散布液調製後は、できるだけ速やかに散布して下さい。
- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失ないように散布して下さい。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにして下さい。ホタルイは3葉期まで、ミズガヤツリは草丈17cmまで、ウリカワは2葉期まで、クログワイは草丈15cmまで、オモダカは矢じり葉1葉期まで、コウキヤガラは草丈30cmまで、キシュウスズメノヒエは再生茎3葉期までが本剤の散布適期です。クログワイ、オモダカは発生期間が長く、遅い発生のものまでは、十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用して下さい。
- 無人航空機で滴下する場合は、次の注意を守って下さい。
 - ①滴下は使用機種の使用基準に従って実施して下さい。
 - ②滴下に当っては散布装置のノズルを取り外して下さい。
 - ③作業中、薬液が漏れないように機体の配管その他の装置の十分な点検を行って下さい。
 - ④薬液の飛散によって適用作物以外の作物に影響を及ぼすおそれがあるで、周辺作物に薬液がかからないように風の影響などを十分考慮して滴下して下さい。
 - ⑤水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意して下さい。
 - ⑥薬剤滴下に使用した装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理して下さい。
 - ⑦本剤の滴下に使用した無人航空機の散布装置は、水稻以外の作物への薬液散布には使用しないで下さい。
- 本剤処理後3～4日間はそのまま湛水を保ち、田面を露出させないようにし、処理後7日間は落水、かけ流しはしないで下さい。また、入水は静かに行って下さい。

● 使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。



バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropscience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎ 0120-575-078 9:00～12:00, 13:00～17:00 土日祝日および会社休日を除く

F-3293 23.05.jeki