



灌注処理でも、 行き場なし。

まったく新しい作用性、
優れた浸透移行性で
やっかいな害虫も見逃さない！

モベント[®] フロアブル

ポット苗への手軽な灌注で、
定植後、長期間主要害虫の
発生を抑えます。



アザミウマ類



アブラムシ類



コナジラミ類



ハダニ類



チャノホゴリダニ



ポット苗灌注

茎葉散布



モベント[®]フロアブルは1剤で…

- 灌注処理と茎葉散布の2つの使い方が
できます。
- 幅広い吸汁性害虫に加え、ハダニ類
まで防除できます。



輸送時など苗を
まとめた時に
処理すると作業
がしやすい
です。

きゅうりの 株元灌注

新芽にかからない
ように注意して下
さい。
水圧が強い場合は
軍手などでカバーを
して、水の勢いを
弱めて飛散を抑える
ことがポイントです。

●「定植3日前～当日」が本圃での効果が続くおすすめの処理時期です。

●灌注処理前の灌水はさけて下さい。

●薬液が直接地面にこぼれ落ちないように、ビニールシートなどを敷いて作業して下さい。

●軟弱な苗や極端にステージの若い苗（セル苗、プラグ苗）、ロックウール苗は薬害を生じるおそれがあるので本剤の使用はさけて下さい。

適用害虫と使用方法（灌注処理のみ抜粋）

2020年5月現在の登録内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量 / 株	使用時期	使用回数*		使用方法
					本剤	スピロテトラマト	
きゅうり	アザミウマ類 ハダニ類	500倍	50ml	育苗期後半 ～定植当日	1回	3回 (灌注は 1回)	株元 灌注
	アブラムシ類 コナジラミ類		25～50ml				
	アザミウマ類 チャノホコリダニ ハダニ類		50ml				
なす ピーマン とうからし類	アブラムシ類 コナジラミ類	500倍	25～50ml				灌注

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量 / 株	使用時期	使用回数*		使用方法
					本剤	スピロテトラマト	
メロン すいか	アザミウマ類 ハダニ類	500倍	50ml	育苗期後半 ～定植当日	1回	3回 (灌注は 1回)	灌注
	アブラムシ類 コナジラミ類		25～50ml				
	アザミウマ類 ハダニ類		50ml				
いちご	アブラムシ類 コナジラミ類	500倍	25～50ml				

*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

■「散布」でも使用できます。詳しくは製品ラベルをご確認ください。

注意事項

- 使用前に良く振ってから使用して下さい。
- 本剤を軟弱な苗に灌注または株元灌注すると薬害を生じるおそれがあるので、注意して下さい。きゅうりに株元灌注する場合には、薬液が新芽にかかると縮葉等の薬害を生じる場合があるので、かからないように処理して下さい。
- 本剤をきゅうり、すいかおよびメロンのセル成型苗に株元灌注または灌注すると、薬害を生じるおそれがあるので注意して下さい。
- 機能性展着剤を加用してなすに散布する場合、果実表面にくぼみ状の薬害が生じるおそれがあるので事前に薬害の有無を確認して使用して下さい。
- 室に対して長期間毒性があるので、周辺の桑葉にかからないようにして下さい。
- 本剤はマルハナバチに影響があるので、本剤を使用する場合には他の方法で受粉作業（人工授粉、植物ホルモンなど）を行って下さい。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 最高分けつ期から出穂開花期の稲に本剤がかかると不稔などの薬害が生じる場合があるので、かからないように注意して下さい。

- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用して下さい。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 誤飲などのないように注意して下さい。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けて下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに水洗して下さい。
- 使用の際は農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換して下さい。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯して下さい。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意して下さい。
- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管して下さい。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropsience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎0120-575-078

9:00～12:00、13:00～17:00
土・日・祝日を除く

F-1066 20.05.TA